

Số: 392/ CV - UBND
(V/v đơn đốc tăng cường phòng
trừ sâu bệnh hại cây trồng năm
2024)

Tân Hoà, ngày 21 tháng 9 năm 2024

Kính gửi:

- Các ông/bà trưởng xóm;
- Các ngành liên quan.

Thực hiện Công văn số 2510/BCĐ-NN ngày 24/9/2024 của Ban chỉ đạo sản xuất Nông, Lâm Nghiệp và Thủy sản huyện Phú Bình về việc Tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng năm 2024 và kiểm soát ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Qua kết quả thăm đồng hiện nay lúa mùa muộn giai đoạn đòng - trổ báo. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn dự kiến thời tiết trong những ngày tới trời nắng nóng, xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng cần chú ý các loại sâu bệnh gây hại cây trồng, cụ thể như: Rầy các loại, sâu đục thân 2 chấm, chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá vi khuẩn, bệnh đạo ôn cổ bông... gây hại trên cây lúa; Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhậy, bệnh sương mai... gây hại trên cây rau; Sâu keo mùa thu, sâu ăn lá... gây hại trên cây ngô.

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, UBND xã Đề nghị các xóm chỉ đạo nhân dân thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng trong thời điểm hiện tại như sau:

1. Đối với công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa:

1.1. Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn

Hiện tại diện tích lúa muộn (U17) giai đoạn đòng to - trổ, để bảo vệ lá đòng không bị lây bệnh bạc lá từ các lá bị bệnh cần tiếp tục kiểm tra đồng ruộng phun phòng trừ bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Starner 20WP, Kasumin 2SL, Visen 20SC...

1.2. Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ rầy đặc biệt trên trà lúa nếp và trà lúa U17, phun thuốc trừ rầy với những ruộng lúa có mật độ 40-50 con/khóm (2.000 - 2.500 con/m²).

- Đối với những diện tích lúa đang làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Actara 25WG, Chess 50WG, Sutin 5EC, 50SC, Matoko 50WG...

- Đối với những ruộng khô hạn và lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Bassa 50EC, Butyl 10WP, 40WG, 400SC, Applaud 25WP, Florid 700WP, Nibas 50EC, Brimgold 200WP... (Yêu cầu phải rẽ lúa thành luống, mỗi luống rộng từ 0,5 - 0,6m và phun trực tiếp vào gốc lúa nơi rầy tập trung gây hại).

1.3. Sâu đục thân 2 chấm: Phun phòng trên trà lúa nếp và U17 trở sau ngày 5/10/2024;

+ Thuốc phun: Sử dụng một trong các thuốc trừ sâu đục thân hại lúa được đăng ký trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam ví dụ như: Boxing 405EC; Confitin 18EC; Reasant 3.6EC; Gà nòi 95SP...

Thời gian phun từ 01/10/2024 đến 10/10/2024 (phun trước trổ bông đến thấp thò từ 3-5%).

1.4. Đối với bệnh khô vằn hại lúa

Tiếp tục kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh và phun thuốc. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu khi xuất hiện ổ bệnh: Nativo 750WG; Antracol 70WP; Vivadamy 3SL, 5SL; Tilt Super 300EC.

1.5. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông, cổ gié

Tiến hành phun thuốc phòng bệnh trên các giống như U17, các loại lúa nếp... Sử dụng một trong các thuốc trừ bệnh đạo ôn hại lúa: Amistar Top 325SC; Fuji-One 40EC, Katana 20SC...

Thời điểm phun khi lúa trổ được 10% số bông trên ruộng hoặc sau khi lúa trổ thoát.

Chú ý: + Khi lúa đang trổ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát.

+ Nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

2. Đối với cây rau màu: Với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch cần khẩn trương thu hoạch ngay giải phóng đất cho gieo trồng vụ đông. Ngoài cần theo dõi chú ý sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, sâu đục thân nồn gây hại cây ngô; rệp muội, bọ nhậy... gây hại rau.

3. Các thành viên BCD sản xuất nông nghiệp xã

Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với các xóm chỉ đạo các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại trên cây trồng kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT.HĐND;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Lãnh đạo UBND;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.



Đào Văn Trung