

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /CV-UBND
V/v tăng cường phòng trừ
sâu bệnh hại lúa Mùa năm 2023

Tân Hòa, ngày 05 tháng 09 năm 2023

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo sản xuất xã;
- Trưởng các ngành đoàn thể
- Các ông bà trưởng xóm;

Căn cứ tình hình sâu bệnh hại lúa mùa năm 2023. Hiện nay, cây lúa trà mùa sớm đang giai đoạn trổ bông - chín sữa, lúa mùa trung giai đoạn đòng - đòng to, lúa mùa muộn đang giai đoạn cuối đẻ đứng cái – làm đòng. Thời tiết hiện nay nắng mưa xen kẽ thuận lợi cho một số sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn dự kiến thời tiết trong những ngày tới nắng nóng, xen kẽ có mưa là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng phát sinh gây hại cây trồng: Rầy các loại, sâu cuốn lá, bệnh khô vằn... phát sinh gây hại. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, UBND xã đề nghị ban chỉ đạo các xóm thực hiện các nội dung sau:

*** Đối với sâu cuốn lá nhỏ:**

Hiện nay, diện tích lúa mùa muộn bị sâu cuốn lá gây hại rất cao so với cùng kỳ hàng năm, đặc biệt hại nặng trên các ruộng phun không kịp thời, phun xong gặp mưa.

Đề nghị bà con chú ý trà lúa Mùa trung trổ từ 10/9 trở đi và trà lúa Mùa muộn giai đoạn đứng cái - làm đòng. Điều tra theo dõi diễn biến của trưởng thành sâu cuốn lá, phun thuốc trừ sâu nếu thấy mật độ sâu non từ 20 con/m² trở lên, những ruộng có mật độ sâu cao trên 50 con/m² phải phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày. **Thời gian phun tập trung từ ngày 09/09 đến 15/09/2023.** Sử dụng một trong các loại thuốc như: Match 50EC; Comda gold 5WG; Clever 150SC; Sherzol 205EC; Radiant 60SC; Indogold 150SC; Virtako 40WG...

*** Đối với rầy các loại:** Tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm ổ rầy, đặc biệt trên các trà lúa chắc xanh, chín sấp, chủ động phun trừ kịp thời những ruộng có mật độ rầy từ 50 con/khóm (2.000-2.500 con/m²).

- Đối với những diện tích lúa đang làm đòng - trổ, ruộng chủ động nước nên sử dụng các loại thuốc như: **Actara® 25WG, Chess® 50WG, Sutin 5EC, 50SC, Chersieu 50WG...**

*** Đối với bệnh khô vằn:** Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây lúa khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu có trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam để phun trừ ví dụ như: **Validacin 5SL; Tilt Super® 300EC; Saizole 5SC; Anvil® 5SC; Sagograin 300EC...** Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng phải tiến hành phun lại.

Chú ý: + Khi lúa đang trổ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát.

+ Nồng độ, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

UBND xã yêu cầu ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã, các ngành đoàn thể, các ông bà trưởng xóm đôn đốc bà con tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tạ Quang Đạt